

**Fecha de implementación y rondas adicionales**  
2009, 2011

**Cobertura del paquete**

Las advertencias sobre la salud deben cubrir el 50% del frente y el 50% del dorso del paquete. En total, el 50% del espacio del paquete está destinado a las advertencias sobre la salud.

**Cronograma de rotación e historia**

Se utilizan dos advertencias sobre la salud en los paquetes de tabaco. Irán ha producido dos series de

etiquetas de advertencia sobre la salud. La primera serie se implementó en 2009. Un segundo grupo de dos advertencias sobre la salud se implementó en 2011.

**Restricciones sobre la información engañosa**

Se prohíbe que los descriptores engañosos tal como “ligero” y “suave” figuren en los paquetes.

### ADVERTENCIAS

2011



### ADVERTENCIAS

2009



مصرف سیگار از عوامل عمده بروز سرطان دهان و لب می باشد. این نوع سرطان مشکلاتی در جویدن و بلعیدن ایجاد می نماید

استعمال دخانیات سبب بروز آسیب های جدی به مخاط دهان و زبان و در نهایت سرطان زبان می شود

مواجهه با دود سیگار، فلان و مواد دخانی مصرف شده توسط والدین و اطرافیان باعث ایجاد و تشدید بیماریهای تنفسی، آسم و عفونت گوش میانی می شود



استعمال دخانیات سبب آسیب های جبران ناپذیری به بافت چشم، اعصاب مرکزی بنایی و در نهایت کوری می شود.

افراد سیگاری ۳ برابر بیشتر از افراد غیرسیگاری در معرض خطر ابتلا به انواع سرطانهای پوست هستند