

В 2001 году Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза об использовании предупредительных надписей на пачках сигарет обрела статус закона. Как минимум, на табачных пачках должны присутствовать текстовые предупреждения; использование графических предупредительных надписей обязательным не является. Еврокомиссия разработала серию графических и текстовых предупредительных надписей на выбор государств-членов.

Дата внедрения и дополнительные раунды 2004

Площадь размещения на упаковке

В странах-членах ЕС должны использоваться предупредительные надписи, соответствующие приведенным ниже требованиям:

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Без рамки			С учетом рамки		
	всего	передняя	задняя	всего	передняя	задняя
Одноязычные страны	35%	30%	40%	48%	43%	53%
Двухязычные страны	39%	32%	45%	52%	45%	58%
Трехязычные страны	43%	35%	50%	56%	48%	63%

График ротации и хронология

Разработаны выборочные серии, состоящие из 42 графических предупреждений. Рекомендации в отношении частоты ротаций не даются.

Ограничения в отношении информации, вводящей в заблуждение


Установлен запрет на использование на упаковках таких вводящих в заблуждение определений, как «легкие» и «мягкие».

Примечания

Предупредительные надписи, разработанные для использования в странах Евросоюза, размещаются на упаковках табачной продукции и в других странах Европы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

2004



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

2004



Smoking can damage the sperm and decrease fertility



Smoking can damage the sperm and decrease fertility



Smoke contains benzene, nitrosamines, formaldehyde and hydrogen cyanide

The risk of having a stroke is approximately 50% higher in smokers than in non-smokers

Smoking clogs the arteries and causes heart attacks and strokes



Smoking when pregnant harms your baby



Smokers die younger



Smoking can cause a slow and painful death

Get help to stop smoking: 0803 00 00 00



Smoking causes fatal lung cancer



Smoking causes fatal lung cancer



Smoking causes fatal lung cancer

Stopping smoking reduces the risk of fatal heart and lung diseases




Smoking may reduce the blood flow and causes impotence



Smoking may reduce the blood flow and causes impotence



Smoking may reduce the blood flow and causes impotence



Smoking when pregnant harms your baby

You can do it, we can help

Your doctor or your pharmacist can help you stop smoking



Smoking causes ageing of the skin



Stopping smoking reduces the risk of fatal heart and lung diseases



Smoking causes ageing of the skin

Lifetime smokers lose an average of 14 years of life

Smokers die younger



Smokers die younger

0803 00 00 00

Choose freedom, we'll help you

Get help to stop smoking

Smoking is a serious nicotine addiction, don't be afraid to ask for help

Your doctor or your pharmacist can help you stop smoking

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

2004

